



# Антилин

Новинка!

## СОДО-ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ

9 г/кг никотина



Применяется в качестве природного инсектицида для борьбы с сосущими и листогрызущими насекомыми-вредителями плодовоовощных, ягодных и цветочно-декоративных культур в личных подсобных хозяйствах.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Содержимое пакета (250 г) развести в 5 л воды. Настаивать 2 суток. Настой перед заливкой в садовый опрыскиватель тщательно фильтруют.

Опрыскивание проводят в ранние утренние часы, после того как высохнет роса, или в вечернее время, до выпадения росы, в тихую безветренную погоду. При опрыскивании надо добиваться мелкого распыления, следя за тем, чтобы наконечник опрыскивателя был не ближе 0,5 м от обрабатываемой поверхности.

Опрыскивание начинаю от с верхних ярусов кроны, постепенно переходя к средним и нижним, обрабатывая при этом и нижнюю сторону листьев. Зараженные верхушки кустов лучше прополоскать в ведре, наклоня гибкие побеги. Если после опрыскивания прошел дождь, обработку повторяют.

Воду для приготовления настоя использовать лучше мягкую – дождевую или речную. Эффективней всего использовать свежеприготовленный настой.

### ОХРАНА ПОЛЕЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

- При работе с продуктом не допускайте попадания в сточные воды, реки и другие водоемы.
- Класс опасности для пчел – 3 – малоопасный.
- Избегайте обработки растений в период посещения ими пчел.
- Соседние плодоносящие растения, не подлежащие обработке, прикрыть пленкой или нетканым материалом.
- Неиспользованные остатки препарата утилизируют, закапывая в землю.
- Освободившуюся тару направляют в места сбора бытовых отходов.